



CENTRE
DE RÉADAPTATION
DE L'OUEST DE MONTRÉAL

WEST MONTREAL
READAPTATION
CENTRE

L'administration sécuritaire des médicaments

DÉPEND DE VOUS!

Pour chaque environnement, un intervenant sur les lieux doit être nommé responsable d'assurer l'administration sécuritaire des médicaments. Cette responsabilité comporte :

1. La vérification des médicaments dès la réception (si erreur, retourner le Bubble Pack à la pharmacie).
2. L'organisation des lieux (les Bubble Pack sont conservés sur un support de rangement prévu à cet effet dans un endroit sous clé ; les médicaments sont administrés dans la même salle où les médicaments sont rangés).
3. L'identification de l'utilisateur avec deux photos (une sur le support de rangement et l'autre, le « red binder »).

Dès la réception des médicaments et lors d'un changement de médication :

1. Prendre la grille de contrôle fournie par la pharmacie et l'entête de la fiche du Bubble Pack ; vérifier si l'information est la même.
2. Vérifier que le nombre de comprimés dans chaque alvéole est le même que celui affiché à l'entête du Bubble Pack.
3. Si vous soupçonnez une erreur, contacter la pharmacie ou vous rendre sur les lieux.

Avant d'administrer le médicament:

1. Ne pas manipuler la médication avec les doigts, ni se promener avec le Bubble Pack de l'utilisateur.
2. Vérifier les deux photos de l'utilisateur ainsi que son nom sur le support de rangement du Bubble Pack et le « red binder » avant d'administrer le médicament.
3. S'assurer que les allergies ou intolérances aux médicaments sont identifiées sur le support de rangement et que les consignes de préparation sont respectées.
4. Respecter le mode d'administration du médicament : par voie orale, nasale, etc.
5. Préparer le médicament selon l'information inscrite sur le support de rangement (par exemple, le médicament doit-il être pris en entier, écrasé, avec du liquide ou de la nourriture, etc.).

Administration du médicament:

1. Administrer les médicaments à un utilisateur à la fois.
2. Retirer le médicament en soulevant (détachant) le papier qui recouvre le dessus du Bubble Pack avec le pouce et l'index, à la date correspondant au jour approprié; donner le médicament immédiatement à l'utilisateur concerné.
3. Vérifier que l'utilisateur a bien avalé son médicament en examinant l'intérieur de sa bouche.
4. Indiquer vos initiales sur la grille de contrôle de la médication.
5. Replacer les médicaments sur le support de rangement prévu à cet effet une fois tous les médicaments administrés, et s'assurer qu'ils sont rangés dans un endroit sous clé.

Important

Ne jamais administrer de médicament avec du jus de pamplemousse.

Le nombre de comprimés administrés au besoin (PRN) par utilisateur doit être calculé tous les mois. Un nombre maximum de 10 comprimés PRN par utilisateur est permis sur les lieux.

Rapporter immédiatement à la pharmacie tout médicament périmé ou ne faisant plus l'objet d'une prescription.

Déclarer toute erreur de médicament tel qu'indiqué dans la procédure sur l'administration sécuritaire des médicaments.